

BITKİLER, UYGULAMA ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI

BITKİ	KULLANIM MİKTARI	UYGULAMA ŞEKLİ
Tarıla ve Endüstri Bitkileri : Hububat, Mısır, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Yem Bitkileri, Şeker Pancarı, Yer Fındığı vs.		Yabancı ot ilaç kullanımı zamanı ve bitkinin sapa kalkma dönemi olmak üzere ila bir tekerimde dekara 150-200 ml veya 100 lt suya 400-450 ml karıştırılıp bitkilere uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.
Yem Bitkileri		İkibahardan itibaren 20-30 gün ara kılarda 100 litre suya 450 cc karıştırılıp yapraklardan uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.
Sera Sebzeçiliğinde : Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, K avun, Karpuz, Kabak, Patates, Çilek, Soğan, Sarımsak, Havuç, Marul, Kereviz, Japonya	Domates sulama sistemi ile dekara 1600-2200 cc tohum yatağına veya bitkinin kök nahiyesine üç ayrı tekerimde uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.	Fidelelerin geçirilmesi esnasında veya bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemden başlamak üzere üç tekerimde uygulanmak kaydıyla 100 lt suya 300 cc karıştırılıp bitkilere yapraklardan uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.
Açık Alan Sebzeçiliğinde : Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, K avun, Karpuz, Kabak, Patates, Çilek, Soğan, Sarımsak, Havuç, Marul, Kereviz, Japonya	Domates sulama sistemi ile dekara 2200-2500 cc tohum yatağına veya bitkinin kök nahiyesine üç ayrı tekerimde uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.	Fidelelerin geçirilmesi esnasında veya bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemden başlamak üzere üç tekerimde uygulanmak kaydıyla 100 lt suya 350 cc karıştırılıp bitkilere yapraklardan uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.
Soğuk Bitkileri :	Domates sulama sistemi ile dekara 2000-2200 cc bitkinin kök nahiyesine üç ayrı tekerimde uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.	Soğuk Bitkileri 3-4 yapraklı olduğu dönemden başlamak üzere üç tekerimde uygulanmak kaydıyla 100 lt suya 300 cc karıştırılıp bitkilere yapraklardan uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.
Meyveler : Tağ ve Yumruşak Çiğirdekli meyve ağaçları, Muz, Narenciye Ağaçları, Bağ, Zeytin, Fındık vs.	Domates sulama sistemi veya sağlama sulama sistemi ile ağaç başına 80-100 cc bitkinin kök nahiyesine üç ayrı tekerimde uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.	Üç ayrı uygulama tavsiye edilmektedir. 1- Tomurcuk ve çiçeklenme dönemi 2- Meyve teşekkülü dönemi 3- Meyvelerin büyüme ve devam ettiği mevsim ortasında 100 lt suya 400 cc karıştırılıp bitkilere yapraklardan uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.

Lisans no : 936

Tescil no :

Parti Seri no :

Üretim Tarihi :

Son kullanma tarihi : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

Net Ağırlık :

URETİCİ:

ALAGROFERT KİMYA TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres :

Unvan Mah. 1218 Sok İnecadağ Köyü C Blok K.1 No: 4 Konyaaltı/ANTALYA

Tel & Fax : 0 242 228 70 52



ORGANİK GÜBRE

GOLDLINE

BITKİSEL MENŞEİLİ SIVI ORGANİK GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

: % w/w

Toplam Organik Madde

: 45

Toplam Azot (N)

: 2.05

Organik Azot (N)

: 2.01

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)

: 1

Toplam (Hümkik+Fülvik) Asit

: 26

pH

: 4-6

Üretimde kullanılan hammadde

: Üzüm Posası

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini
garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek
olumsuzluklar firmamızın garantisine dâildir. Hatalı kullanım ve depolama
yaşarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalınlıklar, ekli olmayış
vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ :

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir

şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

UYARILAR:

Aşırı uygun doz miktarını aşmayınız.

Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Orijinal ambalajında normal şartlar altında

(serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz

bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
özelliklerini muhafaza eder.

Depolama sıcaklığı: +5 ile +40°C derece arasında olmalıdır.

ALAGROFERT KİMYA TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Unvan Mah. 1218 Sokak İnecadağ Köyü C Blok K.1 No: 4 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 228 70 52
Fax: 0242 228 70 52
E-posta: info@alagrofert.com.tr
www.alagrofert.com.tr

İş bu etiket örneği piyasaya sürülecektir. Etiketli aynısıdır. Aksi takdirde 4703 sayılı
kanun hükümlerince hakkımızda yapılacak cezai işlemlerin tümünü peşinen kabul ederim.