

EC FERTİLİZER
KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ
(Yapraktan Uygulamalar İçin)
NUTRAMAX PLUS

<u>Garanti Edilen İçerik:</u>	<u>% W/W</u>
Toplam Azot (N)	8
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	8
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	15
Suda Çözünür Bor (B)	0,3



ÜRETİCİ FİRMA

ALAGROFERT KİMYA TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uncalı Mah. 1218 Sokak İnceadağ Konutları C Blok K:1 No:4 Konyaaltı-ANTALYA
Tel: 0242 2287052

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firma garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış vb.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Orijinal ambalajında, normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5 °C ile +40 °C arasında olmalıdır.

UYARILAR

- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.
- Sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Gübreleme esnasında, maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas halinde bol su ile yıkayınız.

Lisans no: 1327

Tescil no:

Ürün parti no:

İmal tarihi:

Son kullanma tarihi: Üretim Tarihinden İtibaren Üç Yıldır.

Ürünün Garanti edilen Net Ağırlığı veya Hacmi :

Net Ağırlık: 0,25-0,5-0,7-0,9-1-1,2-1,3-1,5-2-3-4-5-6-7-10-12-15-16-18-20-22-24-25-30-40-50 kg



BİTKİLER, UYGULAMA ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI

BİTKİLER	KULLANIM ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA
Süs Bitkileri	Yapraklanma dönemi ve sonrası	250-300 cc/100 lt suya
Sera Sebzelerinde	Dikimden 3 hafta sonra 2-3 hafta arayla	150-200 cc/100 lt suya
Açık Alan Sebzelerinde	Çiçek öncesi ve çiçek sonrası 15 gün arayla	150-200 cc/100 lt suya
Yaprağı Yeneni Sebzelerde	3-4 yapraklı dönem ve 15 gün sonrası	250-300 cc/100 lt suya
Kavun, Karpuz, Kabak vb.	3-4 yapraklı dönem ve 15 gün sonrası	150-200 cc/100 lt suya
Çilek, Ahududu vb.	Çiçek öncesi ve çiçek sonrası 15 gün arayla	150-200 cc/100 lt suya
Bağlarda	İnce ve koruk döneminde 2 uygulama	150-200 cc/100 lt suya
Y. Çekirdekli Meyveler	Çiçekten 3 hafta sonra 2-3 uygulama	150-200 cc/100 lt suya
S. Çekirdekli Meyveler	Çiçekten 3 hafta sonra 2-3 uygulama	150-200 cc/100 lt suya
Narenciye, Muz, Fındık vb.	Çiçek öncesi ve çiçek sonrası 15 gün arayla	150-200 cc/100 lt suya
Endüstri Bitkilerinde	Çapadan sonra 15 gün arayla	150-200 cc/100 lt suya
Tarla Bitkileri	Kardeşlenme dönemi ve 15 gün sonra	350-400 cc/100 lt suya

Bu etiket örneğinin piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

ANTALYA
ZİRAAT ÜRETİM DENET MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM
25-12-2015