

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ



PİCASSO DRİP (18-18-18)+(2 MgO)+(10 SO₃) + TE

28-09-2015

<u>Garanti Edilen İçerik:</u>	<u>%W/W</u>
Toplam Azot (N)	18
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	3,3
Üre Azotu (NH ₂ -N)	14,7
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	18
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	18
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	2
Suda Çözünür Kükürt trioksit (SO ₃)	10
Suda Çözünür Bor (B)	0,02
Suda Çözünür Bakır (Cu)	0,01
Suda Çözünür Demir (Fe)	0,04
Suda Çözünür Mangan (Mn)	0,04
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,04



ÜRETİCİ FİRMA

ALAGROFERT KİMYA TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uncalı Mah. 1218 Sokak İnceadağ Konutları C Blok K:1 No:4 Konyaaltı-ANTALYA
Tel: 0242 2287052

İRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firma garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış vb.) kullanıcının sorumluluğundadır.

CÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

UYARILAR

- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.
- Sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Gübreleme esnasında, maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanılmış olan boş ambalajları kullanmayıp imha ediniz.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Orijinal ambalajında, normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5 °C ile +40 °C arasında olmalıdır.

Lisans no: 1327

Tescil no:

Ürün parti no:

İmal tarihi:

Son kullanma tarihi: Üretim Tarihinden İtibaren Üç Yıldır.

Ürünün Garanti edilen Net Ağırlığı veya Hacmi :

Net Ağırlık: 0,5- 1 -2-3-5- 7- 9- 10- 12- 15-17- 18- 20 - 25- 30 -40-50 kg

ALAGROFERT KİMYA TARIM
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.
Uncalı Mah. 1218 Sokak İnceadağ Konutları
C Blok K:1 No:4 Konyaaltı-ANTALYA
Tel: 0242 2287052
E-posta: info@alagrofert.com.tr
www.alagrofert.com.tr
Cezayir KAYA
Firma Temsilcisi



BİTKİLER, UYGULAMA ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI

BİTKİLER	YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA	UYGULAMA ZAMANI
Kesme Çiçekçilikte	150-200 gr/100 lt suya	1-1,5 kg/da	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar uygulanır
Sera Sebzelerinde	75-100 gr/100 lt suya	1-1,5 kg/da	Fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanır gerek görüldüğü takdirde hasada kadar uygulanır
Açık Alan Sebzelerinde	100 gr/100 lt suya	1 kg/da	
Yaprağı Yenen Sebzeler	100 gr/100 lt suya	1 kg/da	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar uygulanır
Çilek, Ahududu vb.	75-100 gr/100 lt suya	1-1,5 kg/da	
Kavun, karpuz, Kabak vb.	100-150 gr/100 lt suya	1-1,5 kg/da	
Patates, Soğan, Sarımsak vb.	100 gr/100 lt suya	1 kg/da	
Bağlarda	100 gr/100 lt suya	1-1,5 kg/da veya 10 gr/omca	Yaprak oluşumundan koruk dönemi sonuna kadar devam eder
Y. Çekirdekli Meyveler	100 gr/100 lt suya	1-1,5 kg/da veya 10 gr/ağaç	Çiçeklenme başlangıcından meyve tutum dönemine kadar uygulanır
S. Çekirdekli Meyveler	100 gr/100 lt suya	1-1,5 kg/da veya 10gr/ağaç	
Narenciye, Muz, A. Fıstığı, Fındık vb.	100 gr/100 lt suya	1-1,5 kg/da veya 10gr/ağaç	
Endüstri Bitkilerinde	200 gr/100 lt suya	1kg/da	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar uygulanır
Tahıllarda, Yeşil Alanlarda	200 gr/da	-	Kardeşlenme dönemi boyunca uygulanır

Bu etiket örneğinin piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

ALAGÖR FİRMASI
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.
Unvan Mah. 121/1 Sokak No: 33 Kat: 3
C Blok K: 3 No: 33 Kat: 3 ANKARA
Tel : 0312 220 00 52
Antalya Temsilcisi