

EC FERTİLİZER

ZINC-B-TECH

KULLANIM YERİ , ZAMANI ve DOZU :

BİTKİ	MİKTAR	UYGULAMA ZAMANI
Sebze	150 cc / 100 lt Su	Fide döneminde 1 defa
	150 cc / 100 lt Su	Çiçeklenme öncesinde
Bağ	150 cc / 100 lt Su	Salkım oluşum döneminde
	100 cc / 100 lt Su	Koruk oluşumunda
Çilek	150 cc / 100 lt Su	Çiçeklenme öncesinde
Meyve	250 cc / 100 lt Su	Sürgün oluşumu ve çiçeklenme döneminde
Çiçek ve Süs Bitkileri	250 cc / 100 lt Su	Gelişme dönemlerinde 2 - 3 kere
Patates	100 lt suya 150-200 cc	Çıkıştan 15-20 gün sonra başlanıp çiçek açana kadarki dönemde 1-2 uygulama yapılır.
Mısır, buğday	100 lt suya 150-200 cc	Uygulama bitki boyu 10-20 cm olduğunda yapılır.
Pamuk	100 lt suya 150-200 cc	Üstten uygulama: Çıkıştan 15-20 gün sonra başlanıp çiçek açana kadarki dönemde 2 uygulama yapılır.
Zeytin	100 lt suya 150 cc	Sürgün gelişimi başladığında uygulama başlanır, çiçeklenme başlangıcına kadar devam eder.
Enginar	100 lt suya 150-200 cc	4-5 yaşraklı dönemde başlanır. 10-15 gün arayla tekrarlanır.

Lisans no : 1327
Tescil no :
Patent Seri no :
Üretim Tarihi :
Son kullanma tarihi : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır,
Net Ağırlık :

ÜRETİCİ:
ALAGROFERT KİMYA TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres :
Uncalı Mah. 1218 Sok.İnceadağ Konutları C Blok K:1 No: 4 Konyaaltı/ANTALYA
Tel & Fax : 0 242 228 70 52

Bor(B) VE ÇİNKO(Zn-Nitrat) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : % w/w

Suda çözünen Bor(B) : 0.3

Suda çözünen Çinko(Zn) : 6

30.07.2013

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR :

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız .

Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız .

Önce etiketi okuyunuz , Evde kullanmayınız .

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz .

İlaç buharını ve zerrlerini tenefüs etmeyiniz .
İlaçlama esnasında hiçbir şey yemeyiniz .

Sigara içmeyiniz .

Deri ve göz ile temasından kaçınınız .

İstenmeyen durumlarda temas bölgesi acilen

bol su ile yıkanmalı , eğer bir tahriş gözlenirse

doktora başvurulmalıdır .

Boş ambalajlar ile doğayı kirliletmeyiniz .

TEDBİRLER : Yutulduğunda zararlı olduğu için

bol su ve süt içiniz . Hemen doktora gidiniz .
Antidotu yoktur , semptomatik tedavi uygulanır .

DEPOLAMA ŞARTLARI : Depolama sıcaklığı

5 ila 40 °C arasındadır

Kesinlikle yanıcı değildir .

Taşıma ve depolama sırasında kollar kesinlikle ters çevrilme -
melidir . Üzerindeki ok işaretine uygun istiflenmelidir .



TAHİRİSİ EDİLMİŞTİR

İş bu etiket örneği piyasaya sunacağımız etiketin aynısıdır. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanun hükmünce hakkımızda yapılacak cezai işlemlerin tümünü peşinen kabul ederiz.

ALAGROFERT KİMYA TARIM
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uncalı Mah. 1218 Sokak İnceadağ Konutları
C Blok K:1 No: 4 Konyaaltı/ANTALYA
Tic. Sic. No: 270900
Antalya T.C. 0705 228 70 52

Ali Hakan TUNGER