

EC FERTİLİZER
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
ZİNCOVER (4-22-0) + ME

<u>Garanti Edilen İçerik:</u>	<u>% W/W</u>
Toplam Azot (N)	4
Üre Azotu (NH ₂ -N)	4
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	22
Suda Çözünür Çinko (Zn)	5
Büre: Büresi düşüktür	



ÜRETİCİ FİRMA

ALAGROFERT KİMYA TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uncalı Mah. 1218 Sokak İnceadağ Konutları C Blok K:1 No:4 Konyaaltı-ANTALYA
Tel: 0242 2287052

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firma garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış vb.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür, hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

UYARILAR

- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.
- Sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Gübreleme esnasında, maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas halinde bol su ile yıkayınız.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Orijinal ambalajında, normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5 °C ile +40 °C arasında olmalıdır.

Lisans no: 1327

Tescil no:

Ürün parti no:

İmal tarihi:

Son kullanma tarihi: Üretim Tarihinden İtibaren Üç Yıldır.

Ürünün Garanti edilen Net Ağırlığı veya Hacmi :

Net Ağırlık: 0,25-0,5-0,7-0,9-1-1,2-1,3-1,5-2-3-4-5-6-7-10-12-15-16-18-20-22-24-25-30-40-50 kg



BİTKİLER, UYGULAMA ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI

BİTKİLER	YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA	UYGULAMA ZAMANI
Kesme Çiçekçilikte	250-300 cc/100 lt suya	300-350 cc/da	Dikimden 15 gün sonra başlanır hasad sonuna kadar 2-3 defa uygulanır
Sera Sebzelerinde	150-200 cc/100 lt suya	300-350 cc/da	
Açık Alan Sebzelerinde	150-200 cc/100 lt suya	350-400 cc/da	
Kışlık Sebzelerde	300-350 cc/100 lt suya	350-400 cc/da	
Kavun, Karpuz, Soğan, Patates vb.	200-250 cc/100 lt suya	350-400 cc/da	Çiçeklenme öncesi başlanır çiçek sonrası 2-3 uygulama yapılır
Bağlarda	150-200 cc/100 lt suya	300-350 cc/da veya 15cc/omca	
Y. Çekirdekli Meyveler	150-200 cc/100 lt suya	400-450 cc/da veya 30 gr/ağaç	
S. Çekirdekli Meyveler	150-200 cc/100 lt suya	400-450 cc/da veya 30 gr/ağaç	
Narenciye, Zeytin, Muz vb.	150-200 cc/100 lt suya	400-450 cc/da veya 30 gr/ağaç	Tarak oluşumundan önce ve sonra 2-3 defa uygulanır
Endüstri Bitkilerinde	150-200 cc/100 lt suya	400-450 cc/da	
Tahıllarda, Yeşil Alanlarda	50 cc/da	-	Kardeşlenme dönemi 2-3 defa uygulanır

07-12-2013

ONAYLANMIŞTIR

Bitkiler Üretim Genel Müdürlüğü

Bu etiket örneğinin piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemi, peşinen kabul ederiz.

ALAN ÖZGÜRT KİMYA TARIM
LIBAAT SANAYİ TİC. A.Ş.
Tic. Sic. No: 27100
Genel Kurul Kararı: 2013/1
Tarih: 2013/12/07
Cetel AKKAYA
Firma Temsilcisi